曾江琴,孙勤国,徐鸿婕,等.小陷胸汤对高血脂小鼠血管内皮的保护作用[J].中国比较医学杂志,2021,31(10):48-53.
Zeng JQ, Sun QG, Xu HJ, et al. Protective effect of Xiaoxianxiong Decoction on vascular endothelium in hyperlipidemia mice [J].
Chin J Comp Med, 2021, 31(10): 48-53.
doi: 10.3969/j.issn.1671-7856.2021.10.008

小陷胸汤对高血脂小鼠血管内皮的保护作用

曾江琴¹,孙勤国¹,徐鸿婕¹,丁晓明¹,牟艳杰¹,蒋跃文^{2*}

(1.武汉市第三医院中医科,武汉 430060;2.湖北中医药大学,武汉 430061)

【摘要】 目的 探讨小陷胸汤对高血脂症(hyperlipemia, HLP)小鼠血管内皮损伤的影响。方法 选用36只C57BL/6小鼠,随机分为对照组,模型组,低剂量组(0.03 g/mL小陷胸汤)、中剂量组(0.06 g/mL小陷胸汤)、高剂量组(0.12 g/mL小陷胸汤)和洛伐他丁组(2.5 mg/kg洛伐他丁),每组6只,通过高脂饲料喂养8周建立HLP模型并予以相应药物进行干预。给药期间观察各组小鼠一般行为学状态,每周称重一次;HE染色观察主动脉血管组织病理学变化;免疫组化法检测小鼠主动脉组织血管假性血友病因子(von Willebrand factor, vWF)的表达;qRT-PCR检测小鼠主动脉组织血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor, VEGF)、酪氨酸蛋白激酶Eph受体B4(Eph receptor B4, EphB4)及其胞膜附着型配体B2(EphrinB2)的mRNA水平;Western blot检测小鼠主动脉组织VEGF、EphB4和EphrinB2蛋白水平。**结果** 与对照组相比,模型组小鼠活动量和摄食量减少,毛发较差,体重增加,主动脉组织中vWF、VEGF、EphB4、EphrinB2表达水平升高;与模型组相比,小陷胸汤各剂量组和洛伐他丁组小鼠活动量和摄食量增加,毛发光亮,体重减少,主动脉组织中vWF、VEGF、EphB4、EphrinB2表达水平降低($P < 0.05$);与低剂量组比较,中、高剂量组小鼠主动脉组织中VEGF、EphB4和EphrinB2 mRNA及蛋白表达水平降低($P < 0.05$)。**结论** 小陷胸汤可抑制HLP的发展,对小鼠血管内皮具有保护作用。

【关键词】 小陷胸汤;高血脂症;血管内皮

【中图分类号】 R-33 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1671-7856(2021)10-0048-06

Protective effect of Xiaoxianxiong Decoction on vascular endothelium in hyperlipidemia mice

ZENG Jiangqin¹, SUN Qinguo¹, XU Hongjie¹, DING Xiaoming¹, MOU Yanjie¹, JIANG Yuewen^{2*}

(1. Department of Traditional Chinese Medicine, Wuhan Third Hospital, Wuhan 430060, China.

2. Hubei University of Chinese Medicine, Wuhan 430061)

【Abstract】 Objective To explore the effect of Xiaoxianxiong Decoction on vascular endothelial injury in mice with hyperlipidemia (Hyperlipemia, HLP). **Methods** Thirty-six C57BL/6 mice were randomly divided into control, model, low dose group (0.03 g/mL Xiaoxianxiong Decoction), medium dose (0.06 g/mL Xiaoxianxiong Decoction), high dose group (0.12 g/mL Xiaoxianxiong Decoction), and Lovastatin (2.5 mg/kg lovastatin) groups. Six rats in each group were fed a high fat diet for 8 weeks to establish the HLP model and administered corresponding drugs for treatment. During the administration period, the general behavioral state of mice in each group was observed and mice were weighed once a week. HE staining was used to observe histopathological changes of aortic vessels. Immunohistochemistry was used to detect expression of von Willebrand factor (vWF) in aortic tissues of mice. qRT-PCR was used to measure mRNA levels of

【基金项目】武汉市卫生计生委科研计划资助项目(WZ18A01)。

【作者简介】曾江琴(1978—),女,硕士,副主任医师,研究方向:经方防治重大疾病的理论与实验研究。E-mail:29271737@qq.com

【通信作者】蒋跃文(1980—),男,博士,副教授,研究方向:经方防治重大疾病的理论与实验研究,心脑血管方向。

E-mail: hbwhjyw@126.com

vascular endothelial growth factor (VEGF), EPH receptor B4 (EphB4), and Ephrin-B2 (EphrinB2) in aortic tissues of mice. Western blot was used to measure the protein levels of VEGF, EphB4, and EphrinB2 in aortic tissues of mice.

Results Compared with the control group, the activity and food intake of mice in the model group was decreased, hair was poor, weight had increased, and the expression levels of vWF, VEGF, EphB4, and EphrinB2 were increased in aortic tissue. Compared with the model group, the activity and food intake of mice in each dose group of Xiaoxianxiong Decoction and the Lovastatin group were increased, hair was brighter, weight was reduced, and the expression levels of vWF, VEGF, EphB4, and EphrinB2 were decreased in aortic tissue ($P < 0.05$). Compared with the low dose group, mRNA and protein expression levels of VEGF, EphB4, and EphrinB2 were decreased in medium and high dose groups ($P < 0.05$).

Conclusions Xiaoxuai decoction inhibits the development of HLP and protects the vascular endothelium of mice.

【Keywords】 Xiaoxianxiong Decoction; Hyperlipidemia; Vascular endothelium

高脂血症 (hyperlipidemia, HLP) 是一种因体内血脂水平过高引发的全身性脂质代谢紊乱疾病^[1], 常见于中老年人, 隐匿性强, 没有明显的临床症状, 但长期得不到改善会诱发冠心病、动脉粥样硬化等一系列心脑血管疾病^[2-3]。有研究表明, HLP 极易损伤血管内皮细胞, 造成血管内皮功能障碍, 进而加重心脑血管疾病^[4]。中医认为, HLP 的核心发病机制为痰瘀阻络^[5-6], 以化痰祛瘀通络方能向愈^[7]。小陷胸汤由黄连、瓜蒌、半夏三味药组成, 黄连降火结热, 瓜蒌润燥涤垢, 半夏散结豁痰, 合之以清热化痰、宽胸散结^[8-9]。本研究采用高脂饲料喂养制作小鼠 HLP 模型, 初步探索小陷胸汤对 HLP 小鼠血管内皮的保护作用, 以期对 HLP 的临床防治提供一定理论基础。

1 材料和方法

1.1 实验动物

36 只 SPF 级 C57BL/6 小鼠, 雄性, 5 周龄, 体重 20~22 g, 于 SPF 级条件下饲养。小鼠由三峡大学实验动物中心 [SCXK(鄂)2017-0012], 动物实验在武汉华联科生物技术有限公司动物中心进行 [SYXK(鄂)2018-0104], 饲养温度 22℃~26℃, 相对湿度 50%~60%, 循环光照。本研究动物实验方案合理, 符合实验动物的“3R”原则, 经武汉华联科生物技术有限公司伦理审查委员会批准 (HLK-20190106-01)。

1.2 主要仪器与试剂

小陷胸汤由黄连 3 g, 瓜蒌 30 g, 半夏 12 g 三方组成, 武汉市第三医院中药房提供。使用传统方法经浸泡、煎煮、过滤、浓缩等步骤制成煎剂, 分别调制每毫升含生药 0.03 g、0.06 g、0.12 g 汤剂, 低温冷藏待用。

洛伐他丁 (上海阿拉丁生化科技股份有限公

司, 中国, 批号: Lot#c1925105); 高脂饲料 (北京华阜康生物科技股份有限公司, 中国, 批号: D12492); 苏木精、伊红、中性树脂、DAB 显色试剂盒 (北京索莱宝科技有限公司, 中国, 批号: G1140、E8090、G8590、DA1010-2); 蛋白质 Marker (thermo, 美国, 批号: 26634); RIPA(强)组织细胞快速裂解液、BCA 蛋白浓度测定试剂盒、兔抗血管内皮生长因子 (vascular endothelial growth factor, VEGF) 抗体、兔抗酪氨酸蛋白激酶 Eph 受体 B4 (EPH receptor B4, EphB4) 及其胞膜附着型配体 B2 (Ephrin-B2, EphrinB2) 抗体 (bioswamp, 中国, 批号: W1689、W1712、PAB43958、PAB33625、PAB41809); SYBR Green PCR 试剂盒 (KAPA Biosystems, 美国, 批号: KM4101); 逆转录试剂盒 (TaKaRa, 中国, 批号: 639505)。

正置显微镜、石蜡切片机 (Leica, 德国, 型号: DM1000); 生物组织包埋机 (湖北泰维科技实业股份有限公司, 中国, 型号: TB-718D); 自动组织脱水机 (湖北康强医疗器械有限公司, 型号: TKD-TSF); 酶标仪 (Ladysystems, 美国, 型号: MK3); 电泳仪 (BIO-RAD, 美国, 型号: mini protean 3 cell); PCR 仪 (杭州柏恒科技有限公司, 中国, 型号: GE48527)。

1.3 实验方法

1.3.1 HLP 小鼠模型的建立、分组和给药

适应性喂养 7 d 后, 对照组 6 只采用正常饲料喂养, 剩余小鼠采用高脂饲料喂养 8 周。将高脂饲料喂养的小鼠随机分为 5 组: 模型组 (0.5 mL 生理盐水)、低剂量组 (0.03 g/mL 小陷胸汤)、中剂量组 (0.06 g/mL 小陷胸汤)、高剂量组 (0.12 g/mL 小陷胸汤) 和阳性对照组 (2.5 mg/kg 洛伐他丁), 每组 6 只, 给予相应药物灌胃治疗, 每日 1 次。每天观察大鼠的毛发状态、摄食量、饮水量、活动量等变化, 每周测一次体重。8 周后, 采用 1% 戊巴比妥钠麻醉后取血, 分离血清, 处死小鼠, 收集脾、肝 (称重)、主动

脉血管组织,保存待测。

1.3.2 HE 染色观察

将小鼠主动脉组织固定,脱水,包埋成蜡块,切至 3 μm ,切片脱蜡,复水,水洗;苏木精染色 3~6 min,水洗;1%盐酸乙醇 1~3 s,水洗;促蓝液返蓝 5~10 s,冲洗 15~30 min;0.5%伊红染色 2~3 min,水洗;80%乙醇 15~30 s,95%乙醇 15~30 s;无水乙醇 1~3 s;二甲苯透明,中性树脂固封;显微镜下拍照观察。

1.3.3 免疫组化染色观察

主动脉血管组织制作切片,脱蜡至水,自来水冲洗 10 min;0.01 mol/L 柠檬酸钠高压修复 20 min, PBS 冲洗 3 min $\times$ 3 次;3% H_2O_2 湿盒孵育 10 min, PBS 冲洗 3 min $\times$ 3 次;10% 山羊血清湿盒孵育 30 min, PBS 冲洗 3 min $\times$ 3 次;滴加兔抗血管假性血友病因子(von Willebrand factor, vWF) 抗体,4 $^{\circ}\text{C}$ 湿盒孵育过夜, PBS 冲洗 3 min $\times$ 3 次;室温下修复 40 min, PBS 冲洗 5 min $\times$ 3 次;滴加 maxvision 二抗,湿盒孵育 1 h, PBS 冲洗 3 min $\times$ 3 次;DAB 染色,自来水冲洗;苏木素复染 3 min,1% 盐酸乙醇分化,自来水冲洗,乙醇脱水后二甲苯透明 3 min $\times$ 2 次,封片;显微镜下拍照观察,分别测量出血管组织中阳性区面积、阳性区积分光密度,计算阳性区域平均光密度值(average optical density, AOD) = 阳性区积分光密度/阳性区面积。

1.3.4 Western blot 检测

提取主动脉组织蛋白并定量,取 20 μg 蛋白置于 80 V 下预电泳 40 min,再在 120 V 下电泳 50 min;采用湿转膜的方式在 90 V 下转膜 50 min,5% 脱脂奶粉封闭 2 h;滴加兔抗 EphB4 抗体(1:1000)、兔抗 EphrinB2 抗体(1:1000)、兔抗 VEGF 抗体(1:500)和膜 4 $^{\circ}\text{C}$ 孵育过夜;PBST 洗涤 5 min $\times$ 3 次;加二抗室温孵育 1 h;PBST 洗涤 5 min $\times$

3 次,滴加 ECL 发光液显影,读取灰度值。

1.3.5 qRT-PCR 检测

取主动脉组织样本,按照试剂盒说明书步骤提取总 RNA 并进行反转录扩增,以 cDNA 为模板进行 Real-time PCR,反应程序为 95 $^{\circ}\text{C}$ 预变性 3 min,95 $^{\circ}\text{C}$ 变性 5 s,56 $^{\circ}\text{C}$ 退火 10 s,72 $^{\circ}\text{C}$ 延伸 25 s,39 个循环。见表 1。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 23.0 软件进行数据的统计分析,计量数据以平均数 $\pm$ 标准差($\bar{x}\pm s$)表示,单因素方差分析法分析多组间的差异, $P<0.05$ 表示差异显著,有统计学意义;采用 Leica Application Suite 图象系统采集主动脉血管组织图片。

2 结果

2.1 小鼠一般状态及体重变化

给药期间,正常组小鼠摄食量、饮水量和活动量均正常,毛发光亮;模型组小鼠摄食量和活动量减少,毛发较差。低、中、高剂量组和洛伐他丁组小鼠行为状态有所好转。

如表 2 所示,与对照组比较,8 周末模型组小鼠体重显著增加($P<0.05$);与模型组比较,8 周末小陷胸汤各剂量组、洛伐他丁组均有显著性降低($P<0.05$)。

表 1 PCR 引物序列

Table 1 PCR primer sequences

引物 Primer	序列 Sequence(5'-3')
EphB4-F	CCTCACTATTCTGCTTTTCG
EphB4-R	AGATTTTCTTCTGCTGTCCT
EphrinB2-F	ATTCAGCCCTAACCTCT
EphrinB2-R	GTCTTGTGGACCGTG
VEGF-F	GACCAAAGAAAGACAGAAC
VEGF-R	GCAGGAACATTTACACG
GAPDH-F	CCTCCGTGTTCTCTAC
GAPDH-R	GACAACCTGGTCTCTCA

表 2 小鼠体重的变化(g)

Table 2 Changes of body weight in mice

分组 Groups	0 周 0 week	2 周 2 week	4 周 4 week	6 周 6 week	8 周 8 week
对照组 Control group	22.08 $\pm$ 0.44	24.55 $\pm$ 1.21	25.45 $\pm$ 1.19	27.55 $\pm$ 1.72	28.80 $\pm$ 1.74
模型组 Model group	21.17 $\pm$ 1.40	25.92 $\pm$ 1.07*	28.20 $\pm$ 0.24*	30.43 $\pm$ 0.47*	32.13 $\pm$ 0.34*
低剂量组 Low-dose group	20.98 $\pm$ 0.46	23.47 $\pm$ 0.68#	24.38 $\pm$ 0.83#	26.02 $\pm$ 1.29#	26.02 $\pm$ 1.59#
中剂量组 Medium-dose group	22.30 $\pm$ 0.68	24.88 $\pm$ 1.29	25.67 $\pm$ 1.55#	26.77 $\pm$ 0.90#	27.43 $\pm$ 0.60#
高剂量组 High-dose group	21.10 $\pm$ 0.78	23.03 $\pm$ 0.64#	24.28 $\pm$ 0.74#	25.10 $\pm$ 0.92#	25.58 $\pm$ 1.02#
洛伐他丁组 Lovastatin group	21.20 $\pm$ 0.91	23.20 $\pm$ 1.23#	24.05 $\pm$ 1.11#	24.48 $\pm$ 1.23#	24.55 $\pm$ 1.19#

注:与对照组比较,* $P<0.05$;与模型组比较,# $P<0.05$ 。

Note. Compared with the control group, * $P<0.05$. Compared with the model group, # $P<0.05$.

2.2 小鼠主动脉血管组织病理形态学观察

如图 1 所示,对照组小鼠主动脉组织外、中、内三层结构清晰完整,排列紧密有序;模型组主动脉内膜增厚,中层平滑肌细胞排列紊乱,弹力纤维出现明显断裂;低、中、高剂量组和洛伐他丁组内皮组织结构及状态均有不同程度改善。

2.3 小陷胸汤对 HLP 小鼠主动脉组织 vWF 含量的影响

如图 2 所示,与对照组比较,模型组小鼠主动脉 vWF 表达显著增加 ($P < 0.05$);与模型组比较,小陷胸汤中、高剂量组和洛伐他丁组 vWF 表达显著减少 ($P < 0.05$)。

2.4 小陷胸汤对 HLP 小鼠主动脉组织中 EphB4、EphrinB2 和 VEGF mRNA 和蛋白表达的影响

如图 3 和图 4 所示,与对照组比较,模型组小鼠 EphB4、EphrinB2、VEGF 的 mRNA 和蛋白表达水平显著升高 ($P < 0.05$);与模型组比较,低、中、高剂量组和洛伐他丁组小鼠 EphB4、EphrinB2、VEGF mRNA 和蛋白表达水平显著降低 ($P < 0.05$);与低剂量组比较,中剂量和高剂量组小鼠主动脉组织中 EphB4、EphrinB2、VEGF mRNA 和蛋白表达水平均显著降低 ($P < 0.05$)。

3 讨论

HLP 是导致动脉粥样硬化的重要病理基础,也是造成心脑血管病变的主要因素,严重危害着人类的身体健康。血管内皮功能障碍与众多心血管疾病关系密切^[10]。血管内皮细胞是血液和管壁组织之间的第一通透性屏障,在抗凝、抗血小板聚集和维持血液通道等方面发挥作用。长期高血脂会促

进内皮细胞产生自由基,氧化生物膜内的不饱和脂肪酸,导致内皮细胞损伤,引起内皮细胞功能障碍^[11]。因此,治疗 HLP 应重视对血管内皮细胞功能的改善。小陷胸汤最早出自张仲景的《伤寒论》,取黄连、半夏、瓜蒌入药,此方辛开苦降^[12],具有清热化痰、宽胸散结之功。本研究以 HLP 小鼠模型为研究对象,证明了各剂量的小陷胸汤可不同程度改善 HLP 小鼠的饮食量和活动量,也显著改善了小鼠主动脉内皮结构损伤、平滑肌细胞排列紊乱程度,提示小陷胸汤对 HLP 小鼠血管内皮具有保护作用。

vWF 是一种由内皮细胞和单核细胞产生的多聚糖蛋白,正常生理状态下储存在胞质内的 Weibel-palade 小体中,内皮细胞受到损伤时会释放过量的 vWF,激活血小板,引发血栓的形成^[13],因此 vWF 被认为是内皮受损的特异性标志物^[14]。在本研究中,HLP 小鼠 vWF 表达明显增加,提示高血脂造成内皮细胞损伤,而经小陷胸汤治疗可以下调 vWF

图 1 小鼠主动脉 HE 染色
Figure 1 HE staining of aorta in mice

注:与对照组比较,* $P < 0.05$;与模型组比较,# $P < 0.05$ 。

图 2 小鼠主动脉组织中 vWF 的表达

Note. Compared with the control group, * $P < 0.05$. Compared with the model group, # $P < 0.05$.

Figure 2 Expression of vWF in aorta of mice

注:与对照组比较, * $P < 0.05$;与模型组比较, # $P < 0.05$;与低剂量组比较, & $P < 0.05$ 。

图3 小鼠主动脉组织中 EphB4、EphrinB2 和 VEGF 的 mRNA 水平

Note. Compared with the control group, * $P < 0.05$. Compared with the model group, # $P < 0.05$.

Compared with the low-dose group, & $P < 0.05$.

Figure 3 Levels of EphB4, EphrinB2 and VEGF mRNA in aorta of mice

注:1:对照组;2:模型组;3:低剂量组;4:中剂量组;5:高剂量组;6:洛伐他丁组。与对照组比较,

* $P < 0.05$;与模型组比较, # $P < 0.05$;与低剂量组比较, & $P < 0.05$ 。

图4 小鼠主动脉组织中 EphB4、EphrinB2 和 VEGF 蛋白的表达

Note. 1, Control group. 2, Model group; 3, Low-dose group. 4, Medium-dose group. 5, High-dose group. 6, Lovastatin

group. Compared with the control group, * $P < 0.05$. Compared with the model group, # $P < 0.05$. Compared with the low-

dose group, & $P < 0.05$.

Figure 4 Expression of EphB4, EphrinB2 and VEGF protein in aorta of mice

的表达,提示小陷胸汤能缓解内皮细胞的损伤。

EphB4/EphrinB2 双向信号通路在血管新生中的意义重大, EphB4 在静脉内皮细胞上特异性地表达,而 EphrinB2 特异性地表达在动脉内皮细胞上^[15]。蔡金等^[16]通过清脑益髓调督法电针治疗急性脑梗死发现,该法通过上调 EphrinB2 表达,促进血管新生而对脑梗死起到治疗的作用。Noren 等^[17]研究表明,在 MOPC315 肿瘤模型中,新生血管内皮细胞表达的磷酸化 EphrinB2 表达量较高,其与肿瘤细胞表达的 EphB4 相互作用并促进血管的新生。VEGF 是血管新生的主要调控因子,能够促进血管内皮细胞的有丝分裂。张振强等^[18]研究表明

HLP 病理条件会刺激大鼠脑组织 VEGF 的表达以促进新生血管的形成。研究表明,高血脂症诱发机体内源性保护的机制之一是促进血管的生成^[19],因此可通过促进血管生成因子的变化判断高血脂症导致的血管内皮损伤的程度。在本研究结果中, HLP 小鼠 EphB4、EphrinB2 和 VEGF mRNA 水平增加,提示高血脂症诱发了机体内源性保护,促进血管的生成,小陷胸汤治疗后的 HLP 小鼠中 EphB4、EphrinB2 和 VEGF mRNA 及蛋白表达水平下降,且中、高剂量组 EphB4、EphrinB2 和 VEGF mRNA 及蛋白表达水平显著低于低剂量组,存在一定的剂量依赖性,提示新生血管减少,进一步提示小陷胸汤能

改善高血脂症引起的病理反应,抑制高血脂症的发展。

综上所述,通过高血脂症导致的小鼠行为变化、主动脉血管组织病变程度及各因子表达水平可判断小陷胸汤具有缓解高血脂症诱导病理反应,改善血管内皮损伤的功效,后续可进一步分析其具体的机制。

参考文献:

- [1] 李月英,钱义明. 中医药治疗高脂血症的研究进展 [J]. 按摩与康复医学, 2013, 12: 17-18.
- [2] 朱铁梁,杨波,郭一沙,等. 黄连素对高脂血症大鼠降血脂及抗氧化作用 [J]. 中国应用生理学杂志, 2017, 33(4): 369-372.
- [3] 邱巧丽,苏洁,陈素红,等. 复方白术提取物对高脂血症大鼠脂质代谢、血液流变学和微循环的影响 [J]. 中成药, 2016, 38(7): 1437-1443.
- [4] 王彤,李京. 中药红曲煎剂治疗高脂血症及其对血管内皮保护作用影响 [J]. 辽宁中医药大学学报, 2018, 20(8): 119-121.
- [5] 张振强,贾亚泉,王自闯,等. 化痰通络汤预先灌胃的合并高脂血症脑缺血大鼠神经系统功能、脑组织病理变化观察 [J]. 山东医药, 2018, 58(43): 47-50.
- [6] 冯利民,李立凤,杜武勋,等. 高脂血症基本病机与证型规律研究进展 [J]. 时珍国医国药, 2012, 23(12): 3101-3103.
- [7] 吴昊,蔡少杭. 血脂异常的中医药研究进展 [J]. 承德医学院学报, 2013, 30(3): 221-224.
- [8] 韩晓春,张成博,马婷,等. 基于网络药理学的小陷胸汤功效机制研究 [J]. 山东中医药大学学报, 2018, 42(6): 539-543.
- [9] 张保国,刘庆芳. 经方小陷胸汤药理学研究与临床应用 [J]. 中成药, 2012, 34(11): 2206-2210.
- [10] Kedziora-Kornatowska K, Czuczejko J, Pawluk H, et al. The markers of oxidative stress and activity of the antioxidant system in the blood of elderly patients with essential arterial hypertension [J]. Cell Mol Biol Lett, 2004, 9(4): 635-641.
- [11] Shin HS, Han JM, Kim HG, et al. Anti-atherosclerosis and hyperlipidemia effects of herbal mixture, *Artemisia iwayomogi* Kitamura and *Curcuma longa* Linne, in apolipoprotein E-deficient mice [J]. J Ethnopharmacol, 2014, 153(1): 142-150.
- [12] 张利民,邹莲霞,巫祖强,等. 小陷胸汤对糖尿病前期痰湿蕴热质患者胰岛素抵抗指数及β细胞功能的影响 [J]. 成都中医药大学学报, 2018, 41(4): 52-55.
- [13] Ruggeri ZM. Von Willebrand factor, platelets and endothelial cell interactions [J]. J Thromb Haemost, 2003, 1(7): 1335-1342.
- [14] 陈路,方红城,张志杰,等. 血脂康对高血压合并高脂血症者血管内皮功能的影响 [J]. 中国医药导报, 2011, 8(24): 72-74.
- [15] 颜坚,彭细峰,蔡玉莲,等. sEphB4 对糖尿病视网膜病变兔模型视网膜血管内皮细胞 EphB4/EphrinB2 和 VEGF 表达的影响 [J]. 中国医药科学, 2018, 8(7): 51-54.
- [16] 蔡金,唐朝政,朱广旗,等. 清脑益髓调督法对 MCAO 大鼠脑组织中 ephrinB2 mRNA 表达的影响 [J]. 时珍国医国药, 2016, 27(7): 1777-1780.
- [17] Noren NK, Foos G, Hauser CA, et al. The EphB4 receptor suppresses breast cancer cell tumorigenicity through an Abl-Crk pathway [J]. Nat Cell Biol, 2006, 8(8): 815-825.
- [18] 张振强,宋军营,贾亚泉,等. 高脂血症对脑缺血大鼠血管调节因子的影响 [J]. 中国动脉硬化杂志, 2014, 22(2): 127-132.
- [19] 张振强,贾亚泉,宋军营,等. 高脂血症对大鼠脑组织 MMP-2 表达及新生血管的影响 [J]. 郑州大学学报(医学版), 2013, 48(5): 609-612.

[收稿日期]2021-01-26