李习艺, 教授, 医学博士, 博士生导师, 广西医科大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任。兼任中国营养学会营养与保健食品分会委员、中国毒理学会生化与分子毒理专业委员会委员、中国老年学和老年医学学会抗衰老分会委员、全国学校食品安全与营养健康专家组成员、广西营养学会副理事长、广西食品安全地方标准审评委员会委员。主要研究方向为营养相关代谢性疾病的分子机制及其防治。主持国家自然科学基金5项, 省厅级科研项目4项; 发表专业论文70余篇, 参编专业书籍5部; 曾获广西科技进步奖三等奖、广西青年科技奖、广东省科学技术三等奖和深圳市创新科技奖。

欧阳轶强, 博士, 高级实验师, 硕士生导师。现任广西医科大学实验动物中心副主任, 实验动物学教研室主任。长期从事实验动物管理及科研工作, 担任《医学实验动物学》和《实验动物学》等本科、研究生教学工作。兼任中国实验动物学会小型猪专业委员会理事、广西实验动物学会常务理事。研究方向是人类疾病动物模型研发和广西特色实验动物开发。目前主要从事树鼩的基因编辑模型研发, 以及树鼩神经系统疾病模型和肿瘤疾病模型等的开发工作。主持国家自然科学基金项目1项, 广西科技平台建设项目1项, 广西自然科学基金重点项目1项; 共计发表学术论文37篇, 其中SCI论文17篇。

利用脑立体定位技术将人源三突变 APP 基因导入海马区构建阿尔茨海默病大鼠模型

肖林林^{1,2}, 杨逸萱^{1,2}, 黎珊杉^{1,2}, 罗兰诗雨^{1,2}, 尹思威^{1,2}, 孙俊铭¹, 施 维¹, 欧阳轶强¹, 李习艺³

(1. 广西医科大学实验动物中心, 南宁 530021; 2. 广西医科大学基础医学院, 南宁 530021; 3. 广西医科大学公共卫生学院, 南宁 530021)

摘要 **目的** 构建脑海马区表达人源三突变淀粉样前体蛋白 (amyloid precursor protein, APP) 的阿尔茨海默病 (Alzheimer's disease, AD) 大鼠模型, 为疾病机制和药物研究奠定基础。**方法** 将24只12周龄SPF级雌性SD大鼠随机分成空白对照组、空载病毒组和实验组, 每组8只; 其中, 实验组通过脑立体定位在海马区注射携带人源三突变 APP 和 NanoLuc 萤光素酶基因的腺相关病毒 (adeno-associated virus, AAV) 进行造模。采用活体成像法观察各组大鼠脑内的病毒表达情况, 新事物识别实验检测各组大鼠的认知记忆能力, 实时荧光定量 PCR 检测 APP 基因表达水平, HE 染色观察脑组织病理, 采用尼氏染色观察海马区病变情况, 用免疫组织化学检测 β -淀粉样蛋白 (amyloid β -protein, A β) 沉积情况。**结果** 活体成像显示实验组与空载病毒组大鼠脑部均检测到报告荧光。新事物识别实验发现实验组大鼠的认知记忆能力比对照组显著下降 ($P < 0.01$)。荧光定量 PCR 显示 APP 基因在实验组大鼠脑内表达水平显著增高 ($P < 0.01$)。重组 AAV 感染大鼠6个月后, 脑组织 HE 染色和尼氏染色显示, 实验组大鼠海马体 CA1 区神经元细胞和尼氏体数量减少而且排列混乱; 免疫组织化学检测实验组大鼠海马 CA1 区及锥形细胞层可以看到明显的棕褐色沉淀, 提示产生了 A β 沉积。**结论** 通过脑立体定位技术联合 AAV 转入人源三突变 APP 基因成功构建的大鼠模型可体现出典型 AD 特征, 该模型可为基于 A β 沉积的 AD 病理研究和药物治疗研究提供动物模型并奠定基础。

关键词 阿尔茨海默病; 淀粉样前体蛋白; 人源三突变基因; 脑立体定位; 大鼠模型

中图分类号 R-332; Q95-33 **文献标志码** A **文章编号** 1674-5817(2025)03-0269-10

基金项目 广西自然科学基金“组织特异性基因编辑技术制作树鼩肝癌模型的探索”(2023GXNSFDA026069)

第一作者 肖林林(1999—), 女, 硕士研究生, 研究方向: 阿尔茨海默病模型。E-mail: 2721357235@qq.com

通信作者 李习艺(1974—), 女, 博士, 教授, 研究方向: 营养学, 人类疾病模型。E-mail: leeciye@163.com。ORCID: 0009-0006-0280-8451;

欧阳轶强(1977—), 男, 博士, 高级实验师, 研究方向: 人类疾病模型。E-mail: ouyangyiqiang@stu.gxmu.edu.cn。ORCID: 0000-0003-2277-4018

Establishment of a Rat Model of Alzheimer's Disease by Introducing Human Triple Mutant *APP* Gene into Hippocampus via Brain Stereotactic Technology

XIAO Linlin^{1,2}, YANG Yixuan^{1,2}, LI Shanshan^{1,2}, LUO Lanshiyu^{1,2}, YIN Siwei^{1,2}, SUN Juming¹, SHI Wei¹, OUYANG Yiqiang¹, LI Xiyi³

(1. Laboratory Animal Center, Guangxi Medical University, Nanning 530021, China; 2. School of Basic Medical Sciences, Guangxi Medical University, Nanning 530021, China; 3. School of Public Health, Guangxi Medical University, Nanning 530021, China)

Correspondence to: LI Xiyi (ORCID: 0009-0006-0280-8451), E-mail: leeciye@163.com;

OUYANG Yiqiang (ORCID: 0000-0003-2277-4018), E-mail: ouyangyiqiang@stu.gxmu.edu.cn

[ABSTRACT] Objective To establish a rat model of Alzheimer's disease (AD) expressing human triple mutant amyloid precursor protein (APP) in the hippocampus, and to provide a model for the study of disease mechanisms and drug development. **Methods** Twenty-four 12-week-old SPF-grade female SD rats were randomly divided into a blank control group, a virus control group and an experimental group, with eight rats in each group; among them, the experimental group received a stereotaxic injection of adeno-associated virus (AAV) carrying the human triple mutant *APP* and NanoLuc luciferase genes into the hippocampus. *In vivo* imaging was used to observe viral expression in the brains of rats in each group, the novel object recognition test was used to assess the recognition memory of the rats in each group, real-time fluorescent quantitative PCR was used to detect the expression level of the *APP* gene, HE staining was used to examine the brain histopathology, Nissl staining was used to assess the hippocampal lesions, and immunohistochemistry was used to detect the deposition of amyloid β -protein (A β). **Results** *In vivo* imaging showed that reporter fluorescence was detected in the brains of rats in both experimental and virus control groups. Fluorescence quantitative PCR showed that the expression level of the *APP* gene was significantly increased in the brains of rats in the experimental group ($P < 0.01$). Novel object recognition test revealed that the recognition memory of rats in the experimental group was significantly reduced compared with that of the blank control group ($P < 0.01$). Six months after recombinant AAV virus infection, HE staining and Nissl staining of brain tissues showed that the number of neurons and Nissl bodies in the CA1 region of the hippocampus in the experimental group was reduced and disorganized; immunohistochemistry testing of the CA1 region of the hippocampus and the pyramidal cell layer of the experimental group revealed prominent brown deposits, indicating A β protein deposition. **Conclusion** The rat model successfully established by stereotaxic injection and AAV-mediated delivery of human triple mutant *APP* gene exhibits typical AD features, providing a valuable animal model for studying AD pathology and developing drug therapies targeting A β protein deposition.

[Key words] Alzheimer's disease; Amyloid precursor protein; human triple mutant gene; Brain stereotaxis; Rat model

阿尔茨海默病 (Alzheimer's disease, AD) 是一种神经退行性疾病^[1-3], 在全球范围内发病率及死亡率均呈上升趋势, 且发病年龄呈年轻化趋势。据《2024年中国阿尔茨海默病报告》统计, 我国的AD及其他痴呆导致死亡、患病及伤残调整生命年等相关指标均高于全球水平, 提示我国在应对AD这一公共卫生挑战上面临严峻考验^[1]。AD的病理特征包括 β -淀粉样蛋白 (amyloid β -protein, A β) 沉积、Tau蛋白过度磷

酸化形成的神经纤维缠结、神经元丢失以及突触损伤。在AD的发病机制研究中, A β 级联假说被公认是经典学说之一^[4-5], 即淀粉样前体蛋白 (amyloid precursor protein, APP) 代谢异常, 不仅导致 β 分泌酶切割途径激活, 同时改变 γ 分泌酶切割位点偏好性, 使APP剪切过程中产生更多毒性A β 沉积, 进而触发神经元损伤、突触功能障碍及脑区特异性神经元死亡。研究表明, *APP*基因突变可通过增强 β 分泌酶切割效率或促

进A β 1-42生成显著加速淀粉样斑块沉积^[6-7]。常见的APP突变类型有Swedish、London和Austrian突变^[8-9]，其是家族性AD的重要诱因^[10]。精准模拟APP异常代谢的动物模型对解析AD病理机制及药物研发至关重要。使用人源性的突变APP导入实验动物脑海马区可以构建模拟遗传突变类型的AD模型。

啮齿类实验动物小鼠常用于AD转基因模型^[11-12]。与小鼠相比，大鼠在认知、行为、大脑结构及药物代谢上更接近人类^[13-14]，且寿命长、体型大，便于操作与采样，更适合构建AD模型。近年来，基于病毒载体的基因递送技术为AD模型构建提供了新策略。腺相关病毒（adeno-associated virus, AAV）凭借其高转导效率、低免疫原性、跨血脑屏障能力及精准的脑区靶向性^[15]，成为神经科学研究中理想的基因递送工具。本研究拟通过脑立体定位注射携带人源三突变（Swedish/London/Austrian）APP基因的AAV载体，构建AD大鼠模型，以期更真实地模拟A β 异常沉积的病理进程，为深入探究AD发病机制和药物开发提供研究基础。

1 材料与方法

1.1 实验动物

24只SPF级雌性SD大鼠均12周龄，体重为(250±20)g，购自广西医科大学实验动物中心[SCXK(桂)2020-0003]。动物饲养于广西医科大学实验动物中心的动物实验室屏障系统[SYXK(桂)2020-0004]，相对湿度50%~60%，温度22~24℃，大鼠可自由饮水和进食。本实验方案通过广西医科大学实验动物伦理委员会的伦理审查(编号为202404010)。所有动物实验操作遵循实验动物伦理福利3R原则。

1.2 主要试剂与仪器

重组腺相关病毒(recombinant adeno-associated virus, rAAV)-APPs1a-Nluc和rAAV-Nluc购自武汉枢密脑科学技术有限公司，均为定制产品；RNA提取试剂盒(批号S20205)、RNA反转录试剂盒(批号R31107)、实时荧光定量PCR试剂盒(批号R10101)均购自北京全式金生物技术股份有限公司；活体成像荧光素酶底物Furimazine(批号162434)购自上海陶素生物科技有限公司；即用型免疫组化SP试剂盒(批号246289710D)购自福州迈新生物技术开发有限公司；A β 蛋白抗体(批号B430350)购自美国BioLegend公司。

小动物活体成像仪购自美国PerkinElmer公司；SMART 3.0小动物行为学记录分析系统、旷场箱、大

鼠新物体识别实验玩具、双通道小动物麻醉机、大鼠脑立体定位气麻呼吸面罩和异氟烷(批号20211520)均购自深圳市瑞沃德生命科技有限公司；荧光定量PCR仪(型号QuantStudio 7 Flex)购自美国Thermo Fisher公司；石蜡包埋与切片机(型号RM2235)和生物显微镜(型号BX53)均购自德国Leica公司。

1.3 重组腺相关病毒载体的构建

采用rAAV载体构建技术^[16]，构建携带人源三突变APP基因的rAAV载体。以携带NanoLuc荧光素酶基因的AAV质粒为骨架载体，整合AAV2血清型的反向末端重复序列(inverted terminal repeats, ITRs)作为病毒基因组复制与包装的顺式作用元件，用在辅助质粒上单独表达的AAV9血清型衣壳蛋白基因(Cap)构建病毒外壳，在NanoLuc荧光素酶基因前插入含Swedish(K670N/M671L)、London(V717I)及Austrian(T714I)三重突变的APP cDNA序列，构建实验组病毒载体质粒。空载病毒质粒不携带人源APP cDNA序列。

空载病毒以及目的病毒的载体结构如图1所示。目的载体携带人源三突变APP基因以及NanoLuc荧光素酶基因，两个基因共用一个启动子，NanoLuc荧光素酶基因位于APP基因之后，若荧光素酶基因成功表达则可推测位于前面的APP基因也成功表达对应蛋白。两者间用P2A肽隔开，使两个蛋白独立表达，以免影响蛋白后续修饰。空载病毒和目的病毒相比，除了缺少人源三突变APP基因外，其他部分皆相同。

1.4 动物分组及脑立体定位接种造模

将24只SD大鼠随机分为空白对照组(blank control group, BC)、空载病毒组(virus control group, VC)以及实验组(experimental group, Exp)，每组8只。空白对照组不做处理，空载病毒组注射AAV空载体(rAAV-Nluc)，实验组大鼠注射携带人源三突变APP基因的AAV(rAAV-APPs1a-Nluc)载体质粒。

将大鼠置于气体麻醉诱导盒内用异氟烷麻醉后，剃去大鼠头部区域毛发，用75%乙醇溶液对皮肤进行消毒，以脑立体定位气麻呼吸面罩维持麻醉，并固定于脑立体定位仪上，暴露大鼠颅骨上的前囟点和后囟点并调节仪器参数：脑立体定位注射位置为正中矢状缝左右旁开2 mm，前囟后3.3 mm，硬脑膜下进针深度3 mm，坐标(±2, -3.3, -3)。使用牙科钻钻至硬脑膜表面后，用5 μ L规格的无菌微量注射器进行病毒注射，双侧脑区各注射2 μ L 1×10^{13} vg/mL的病毒悬液。注射完成后用骨蜡填充注射孔，缝合头皮，碘伏消毒后放回笼中饲养。

注: A 为空载病毒质粒结构图; B 为携带人源三突变 *APP* 基因的质粒结构图。APPsla-L-A 代表人源三突变 *APP* 基因, Nluc 代表 NanoLuc 萤光素酶基因, SYN promoter 是神经元特异性启动子。

Note: A, structure of the empty viral plasmid; B, structure of the plasmid carrying the human triple mutant *APP* gene, APPsla-L-A represents the human triple mutant *APP* gene, Nluc represents the NanoLuc luciferase gene, and SYN promoter is the neuron-specific promoter.

图1 重组腺相关病毒载体结构示意图

Figure 1 Schematic diagram of recombinant adeno-associated viral vector structure

病毒注射后2周及6个月时,称量各组大鼠体重,按照每100 g体重腹腔注射5 mmol/L的萤光素酶底物Furimazine 0.23 mL,注射10~15 min后,将大鼠进行异氟烷气体麻醉,待动物失去知觉后,立刻放入活体成像仪中维持麻醉,调整参数进行生物发光拍照和记录结果。

1.5 新物体识别实验检测大鼠的认知记忆能力

注射病毒6个月后进行各组大鼠的新物体识别实验,具体操作如下:将大鼠放入旷场箱熟悉5 min,将两个完全相同的圆柱体放入旷场箱一侧靠边缘位置;将大鼠再次放入旷场箱中,让其探索10 min,记录大鼠与物体的互动情况;1 h后,将其中一个圆柱体替换为不同颜色的圆锥体,再次将大鼠放入旷场箱中,让其探索10 min,记录大鼠对新旧物体的探索时间、次数等。每次测试结束后,将大鼠放回饲养笼,清洁旷场箱以消除气味。由行为学分析系统识别动物运动轨迹,得出探索时间,然后通过计算新物体识别指数(recognition index, RI)来判断大鼠的学习记忆能力。RI时间值=探索新物体时间/(探索新物体时间+探索旧物体时间),RI距离值=探索新物体距离/(探索新物体距离+探索旧物体距离)。

1.6 荧光定量PCR检测大鼠脑海马区 *APP* 基因表达

行为学实验后,每组随机取4只大鼠,称量其体

重,按50 mg/kg的剂量腹腔注射戊巴比妥钠溶液麻醉大鼠,颈椎脱臼处死大鼠。剥离脑组织,摘取海马体,液氮速冻后置于-80 °C冰箱保存。根据人类三突变 *APP* 基因和大鼠 *APP* 基因的保守区域序列(来源于NCBI网站)设计引物,可同时扩增2种基因,上游引物为5'-ACTGACCACTCGACCAGGTC-3',下游引物为5'-GGCGTCAACCTCCACCACA-3'。内参基因 β -actin的上游引物为5'-TGTCACCAACTGGG-ACGATA-3',下游引物为5'-GGGGTGTGAAGGTC-TCAAA-3'。按照试剂盒说明书步骤提取RNA,并逆转录,对 *APP* 基因进行实时荧光定量PCR扩增,反应程序:94 °C 30 s 预变性;94 °C 5 s,60 °C 30 s,循环扩增40次。反应结束后导出Ct值等数据,运用 $2^{-\Delta\Delta Ct}$ 法计算相对表达量,并进行统计学分析。同时,对实时荧光定量PCR扩增产物采用测序法验证。PCR引物合成及扩增产物测序均由生工生物工程(上海)股份有限公司完成。

1.7 海马区脑组织病理学检测

每组取另外3只大鼠用于组织病理学检测(剩余1只为备用)。大鼠麻醉后用生理盐水灌注心脏以置换血液,再用4%多聚甲醛溶液灌注后剥离脑组织。将脑组织浸泡于4%多聚甲醛溶液固定48 h后,用梯度乙醇溶液常规脱水、二甲苯透明后浸蜡包埋,石蜡切片4 μ m。分别采用HE染色法、尼氏染色法、免疫组

织化学法检测大鼠海马区脑组织的常规组织病理特征、神经元变化以及A β 沉积情况。

HE染色:石蜡切片脱蜡后先用苏木精染色细胞核,分化后再用伊红染液染色;倾去多余染色液后快速脱水,二甲苯透明,中性树胶封固。

尼氏染色:石蜡切片脱蜡后,用尼氏染色液浸染10 min;自来水洗去多余染液,用尼氏分化液分化30 s,终止分化。显微镜下初步观察染色情况,显色清晰即可用乙醇溶液梯度脱水,二甲苯透明,中性树胶封固。

免疫组织化学染色:石蜡切片常规脱蜡,EDTA热修复后,进行内源性过氧化物酶阻断和血清封闭;加入A β 单克隆抗体4℃过夜孵育,漂洗后再加入生物素标记的山羊抗鼠/兔二抗于室温孵育30 min, DAB显色后加入苏木精对比染色细胞核;显微镜下初步观察,

染色正常则脱水封固,然后在光学显微镜下进行观察和拍照。

1.8 统计学分析

采用SPSS 22.0软件对各实验结果数据进行分析处理。符合正态分布且方差齐性的各组数据采用单因素方差分析,组内两两比较采用LSD-*t*检验;不符合正态分布和方差齐性要求的数据用Kruskal-Wallis检验。*P*<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 建模后重组AAV在大鼠脑部有效表达

建模2周后,腹腔注射萤光素酶底物Furimazine进行各组大鼠活体成像(图2),结果显示,实验组与空载病毒组大鼠头部区域可检测到荧光发光,空白对照

注: BC、VC、Exp分别为空白对照组、空载病毒组、实验组(通过脑立体定位在海马区注射携带人源三突变APP和NanoLuc萤光素酶基因的腺相关病毒)。各组大鼠腹腔注射萤光素酶底物Furimazine后10 min观察萤光素报告酶活性。2周后实验组与空载病毒组头部区域可检测到荧光发光,6个月后实验组和空载病毒组的荧光强度都减弱,但仍然可以被检测到;空白对照组未检测到荧光。

Note: BC, VC, Exp are blank control group, virus control group, and experimental group (adeno-associated virus carrying human triple mutant APP and NanoLuc luciferase genes was injected in the hippocampus by brain stereotaxic localization), respectively. The luciferase reporter activity was observed 10 min after intraperitoneal injection of the luciferase substrate Furimazine into rats in each group. 2 weeks later, fluorescent luminescence could be detected in the head area of the experimental group and the virus control group, and 6 months later, the fluorescence intensity of both the experimental group and the virus control group was weakened, but it could be detected; the fluorescence was not detected in the blank control group.

图2 注射病毒2周和6个月后大鼠活体成像情况

Figure 2 *In vivo* imaging of rats two weeks and six months after virus injection

组大鼠未检测到荧光；造模6个月后实验组和空载病毒组的荧光强度都减弱，但仍然可以被检测到。结果证明造模后大鼠脑部有效表达rAAV。

2.2 造模后大鼠的认知记忆能力降低

rAAV感染后，受试大鼠的新物体识别实验结果

(图3)表明，实验组的距离认知指数和时间指数均明显低于空白对照组 ($P<0.01$) 和空载体病毒组 ($P<0.05$)，而空白对照组与空载体病毒组相比差异无统计学意义 ($P>0.05$)。结果提示造模后大鼠的认知记忆能力明显下降。

注：A展示大鼠探索两个相同物体；B为更换了新物体；C为以距离为统计指标的新物体识别实验结果；D为以时间为统计指标的新物体识别实验结果。RI：新事物识别指数。BC、VC、Exp分别为空白对照组、空载病毒组、实验组（通过脑立体定位在海马区注射携带人源三突变APP和NanoLuc荧光素酶基因的腺相关病毒），每组8只大鼠（ $n=8$ ）；与空白对照组相比，** $P<0.01$ ；与空载病毒组相比，# $P<0.05$ 。

Note: A shows rats exploring two identical objects; B is a new object replaced; C is the result of the new object recognition experiment using distance as a statistical index; D is the result of the new object recognition experiment using time as a statistical index. RI: Recognition index. BC, VC, Exp are blank control group, virus control group and experimental group (adeno-associated virus carrying human triple mutant APP and NanoLuc luciferase genes was injected in the hippocampus by brain stereotaxic localization), respectively, 8 rats per group ($n=8$); ** $P<0.01$, compared with blank control group; # $P<0.05$, compared with virus control group.

图3 新物体识别实验检测大鼠认知记忆能力

Figure 3 Novel object recognition test to assess recognition memory of rats

2.3 造模后大鼠海马体中APP基因表达增强

造模6个月后，实时荧光定量PCR检测各组大鼠海马体中APP基因的相对表达量，结果如图4A所示。实验组APP相对表达量与空白对照组和空载病毒组相比显著增高 ($P<0.01$)，而空白对照组与空载病毒组相比差异无统计学意义 ($P>0.05$)。PCR产物测序结果与正常人源APP基因序列比对结果如图4B所示，精准定位到3个突变位点，分别为Swedish突变位点GA突变为TC，Austrian突变位点C突变为T，London突变位点G突变为A。以上突变位点的位置与rAAV载体所设计的预期突变位点完全相符。

2.4 造模后大鼠海马区组织发生明显的病理学变化

rAAV病毒感染大鼠6个月后，海马体的HE染色结果如图5A所示。实验组大鼠的海马体CA1区神经细胞缺失、皱缩、分布稀疏；空白对照组和空载病毒组CA1区神经元细胞结构完整，细胞数量正常，神经元

细胞排列整齐，细胞核大圆且染色清晰。

尼氏染色结果如图5B所示。实验组海马体中尼氏体数量减少，分布稀疏，染色浅淡；空白对照组和空载病毒组的海马体中尼氏体丰富，染色可见形态饱满、色深而匀、数量多而密、排列紧致。

免疫组织化学染色结果如图5C所示。实验组大鼠的海马CA1区及锥形细胞层可以看到明显的棕褐色沉淀，即产生了A β 沉积；空白对照组以及空载病毒组在海马区未看到A β 沉积现象。

3 讨论

AD作为一种复杂的神经退行性疾病，目前尚无完全治愈该疾病的方法。近20年来，全球首个获美国食品药品监督管理局批准的AD新药仑卡奈单抗，也只能通过清除大脑中的有毒A β 蛋白，延缓疾病的临床进程。该疾病不仅对患者的身心健康和生活质量造成了极大的危害，也给家庭和社会带来了沉重的负担。近

注：A，为实时荧光定量PCR检测结果 [BC、VC、Exp 分别为空白对照组、空载病毒组、实验组（通过脑立体定位在海马区注射携带人源三突变 *APP* 和 NanoLuc 荧光素酶基因的腺相关病毒），每组 4 只大鼠 ($n=4$)；与空白对照组相比，** $P<0.01$ ；与空载病毒组相比，## $P<0.01$]。B 为 PCR 产物测序比对结果，黄色高亮部分指示突变位点。

Note: A is the result of real-time fluorescence quantitative PCR. BC, VC, Exp are blank control group, virus control group and experimental group (adeno-associated virus carrying human triple mutant *APP* and NanoLuc luciferase genes was injected in the hippocampus by brain stereotaxic localization), respectively. 4 rats in each group ($n=4$); Compared with blank control group, ** $P<0.01$; Compared with virus control group, ## $P<0.01$. B is the result of real-time fluorescence quantitative PCR product sequencing comparison, and the yellow highlighted part is the indicated mutation site.

图4 大鼠海马体 *APP* 基因表达及测序结果

Figure 4 *APP* gene expression and sequencing results in rat hippocampus

年来，国内外AD患者数量与日俱增，使得该疾病研究刻不容缓，而构建良好的疾病模型对疾病的治疗研究具有至关重要的作用。

灵长类动物与人类的亲缘关系很接近，在构建人类疾病动物模型上具有天然的优势，然而受限于伦理问题和高昂的实验成本，难以作为可推广的实验动物用于研究。所以，目前的AD模型构建大多用大鼠和小鼠。相比于小鼠，大鼠具有更接近人类的神经解剖结构、行为复杂性和代谢特征。本研究在综合考虑成本、病理生理特征及其下游研究价值后，选择大鼠作为构建AD模型的实验动物。

$A\beta$ 异常沉积是AD的核心病理标志之一，其生成直接归因于*APP*的异常剪切^[17-18]。家族性AD患者中，约50%的病例与*APP*基因突变相关，尤其是Swedish、London及Austrian突变，因其对 $A\beta$ 生成的关键调控作用而被广泛关注。造模时引入人*APP*基因可规避物种差异，精准模拟人类AD的 $A\beta$ 沉积特征。本研究采用大脑感染携带Swedish/London/Austrian突变位点的*APP*基因的病毒进行造模，6个月后组织学观察结果显示，海马区神经元数量减少，形态出现萎缩，尼氏体数量减少，分布稀疏，染色浅淡，出现了明显的 $A\beta$ 沉积，此变化与人类AD患者的病理特征一致^[2]。新物体识别行为学实验发现，实验组大鼠的认知能力显著降低，

认知记忆能力衰退，有效模拟了人类AD的临床疾病特征。在现有AD大鼠模型中，也有通过转入*APP*基因进行造模的文献报道，例如有研究者向Tg6590大鼠转入携带Swedish突变位点的*APP*基因^[19-20]，但该模型出现行为认知障碍的时间需9个月甚至更长，出现 $A\beta$ 沉积的时间在15个月以上，成模时间过于漫长；而且该模型动物出现的AD病理特征比较单一，不如本研究中转入三突变*APP*基因的造模效果好。

目前有不少研究者通过基因编辑技术进行AD造模^[21-22]。清华大学研发的*APP*^{NL-G-F}转基因大鼠不仅检测出 $A\beta$ 沉积，6个月后还检测出Tau蛋白磷酸化、突触缺失等特征^[14]，较好地模拟了AD疾病特征；但12个月后才检测出神经元缺失，且胚胎显微注射技术难以避免脱靶效应，不仅限制了目的基因在特定组织功能的研究，而且可能会导致动物发生与AD无关的不良后果。例如有研究发现，Tau转基因小鼠的脊髓出现了细胞坏死，导致后肢残疾，且随着年龄增长，后肢的残疾加重，寿命只有5~6个月^[23]。

另外，还有研究者直接通过脑立体定位注射 $A\beta$ 进行造模^[24]，能在短时间内诱导局部神经炎症，但同时容易激起机体免疫反应，且不符合AD患者脑内 $A\beta$ 沉积来自长期积累的临床发病机制。而本研究通过高效转导低免疫原性的AAV在大鼠脑内持续表达*APP*基

注：BC、VC、Exp 分别为空白对照组、空载病毒组、实验组 [通过脑立体定位在海马区注射携带人源三突变淀粉样前体蛋白 (APP) 和 NanoLuc 萤光素酶基因的腺相关病毒]。黑色箭头所指区域为皱缩坏死的细胞；红色箭头所指区域为尼氏体稀疏，染色浅淡的细胞；蓝色箭头所指区域为 β -淀粉样蛋白沉积区域。

Note: BC, VC, Exp are blank control group, virus control group and experimental group (adeno-associated virus carrying human triple mutant APP and NanoLuc luciferase genes was injected in the hippocampus by brain stereotaxic localization), respectively. The areas indicated by black arrows are crumpled necrotic cells. The areas indicated by red arrows are cells with sparse Nissl bodies and light staining. The area indicated by blue arrow is the area of amyloid β -protein deposition.

图5 大鼠海马体组织的HE染色(A)、尼氏染色(B)和免疫组织化学染色(C)结果

Figure 5 HE staining (A), Nissl staining (B), and immunohistochemical staining (C) results of rat hippocampal region

因, 进而形成 A β 沉淀, 可以更近似地模拟 AD 的发病进程。

NanoLuc 萤光素酶作为基因标记, 与传统的萤光素酶相比, 具有体积小 (约 19 kDa)、亮度高、稳定性好的优点, 结合底物 Furimazine 后可发出强烈蓝光, 可透过头骨被活体成像仪捕捉, 实现了高灵敏度、低背景的生物发光检测^[25-26]。本研究中将三突变 APP 基因与 NanoLuc 萤光素酶基因共用一个启动子, 这种单载体共表达系统避免了多载体共转染的效率不均问题, 使得 NanoLuc 萤光素酶的发光信号可以更准确地指示 APP 基因的表达情况。

本实验采用脑立体定位仪直接注射携带 APP 基因的 AAV, 利用活体成像仪可快速高效地观察造模效果, 对动物创伤小, 检测的灵敏度高, 无需额外注射易淬灭的荧光抗体或牺牲动物获取组织样本, 显著简化了实验流程并符合动物实验伦理的 3R 原则。此设计不仅为 AD 病理机制研究提供了高效工具, 更为大型动物 (如非人灵长类) 或难以基因编辑的物种提供了造模参考, 规避了转基因动物繁育的高耗时与高成本限制。

综上, 本研究通过脑立体定位技术联合 AAV 转入人源三突变 APP 基因成功构建的大鼠 AD 模型, 可体现出典型的 AD 组织病理学和认知行为特征, 为基于 A β 沉积的 AD 病理研究及药物研发提供了动物模型基础。

[医学伦理声明 Medical Ethics Statement]

本研究涉及的所有动物实验均已通过广西医科大学实验动物伦理与使用委员会审批 (审批号: 202404010)。所有实验过程均遵照中国实验动物相关法律法规条例进行。

All animal experiments involved in this study were approved by the Ethics and Use of Laboratory Animals Committee of Guangxi Medical University (Approval number: 202404010). All experimental procedures were conducted in compliance with Chinese laws and regulations related to laboratory animals.

[作者贡献 Author Contribution]

肖林林负责方案设计、实验操作、统计分析、论文撰写及修改; 杨逸萱、黎珊杉、罗兰诗雨和尹思威协助各项实验的实施; 孙俊铭和施维参与实验指导、论文修改; 欧阳轶强和李习艺负责课题方案设计、实验指导、资金支持, 以及论文修改。

[利益声明 Declaration of Interest]

所有作者均声明本文不存在利益冲突。

[参考文献 References]

[1] 王刚, 齐金蕾, 刘馨雅, 等. 中国阿尔茨海默病报告 2024[J]. 诊断

学理论与实践, 2024, 23(3):219-256. DOI: 10.16150/j.1671-2870.2024.03.001.

WANG G, QI J L, LIU X Y, et al. China Alzheimer report 2024[J]. J Diagn Concepts Pract, 2024, 23(3):219-256. DOI: 10.16150/j.1671-2870.2024.03.001.

- [2] SCHELTENS P, DE STROOPER B, KIVIPELTO M, et al. Alzheimer's disease[J]. Lancet, 2021, 397(10284): 1577-1590. DOI:10.1016/s0140-6736(20)32205-4.
- [3] SCHELTENS P, BLENNOW K, BRETELER M M, et al. Alzheimer's disease[J]. Lancet, 2016, 388(10043):505-517. DOI: 10.1016/s0140-6736(15)01124-1.
- [4] BREIJYEH Z, KARAMAN R. Comprehensive review on Alzheimer's disease: causes and treatment[J]. Molecules, 2020, 25(24):5789. DOI:10.3390/molecules25245789.
- [5] JUCKER M, WALKER L C. Alzheimer's disease: From immunotherapy to immunoprevention[J]. Cell, 2023, 186(20): 4260-4270. DOI:10.1016/j.cell.2023.08.021.
- [6] ZHOU B, LU J G, SIDDU A, et al. Synaptogenic effect of APP-Swedish mutation in familial Alzheimer's disease[J]. Sci Transl Med, 2022, 14(667): eabn9380. DOI: 10.1126/scitranslmed.abn9380.
- [7] KIM M, BEZPROZVANNY I. Analysis of non-amyloidogenic mutations in APP supports loss of function hypothesis of Alzheimer's disease[J]. Int J Mol Sci, 2023, 24(3):2092. DOI: 10.3390/ijms24032092.
- [8] ARMBRUST F, BICKENBACH K, MARENGO L, et al. The Swedish dilemma - the almost exclusive use of APPswe-based mouse models impedes adequate evaluation of alternative β -secretases[J]. Biochim Biophys Acta Mol Cell Res, 2022, 1869(3):119164. DOI:10.1016/j.bbamcr.2021.119164.
- [9] SCHILLING S, PRADHAN A, HEESCH A, et al. Differential effects of familial Alzheimer's disease-causing mutations on amyloid precursor protein (APP) trafficking, proteolytic conversion, and synaptogenic activity[J]. Acta Neuropathol Commun, 2023, 11(1):87. DOI:10.1186/s40478-023-01577-y.
- [10] JAWORSKI T, DEWACHTER I, LECHAT B, et al. AAV-tau mediates pyramidal neurodegeneration by cell-cycle re-entry without neurofibrillary tangle formation in wild-type mice[J]. PLoS One, 2009, 4(10): e7280. DOI: 10.1371/journal.pone.0007280.
- [11] XIA D, LIANOGLU S, SANDMANN T, et al. Novel App knock-in mouse model shows key features of amyloid pathology and reveals profound metabolic dysregulation of microglia[J]. Mol Neurodegener, 2022, 17(1): 41. DOI: 10.1186/s13024-022-00547-7.
- [12] CLAYTON K, DELPECH J C, HERRON S, et al. Plaque associated microglia hyper-secrete extracellular vesicles and accelerate tau propagation in a humanized APP mouse model[J]. Mol Neurodegener, 2021, 16(1): 18. DOI: 10.1186/s13024-021-00440-9.
- [13] TESSON L, COZZI J, MÉNORET S, et al. Transgenic modifications of the rat genome[J]. Transgenic Res, 2005, 14(5):531-546. DOI:10.1007/s11248-005-5077-z.
- [14] PANG K L, JIANG R C, ZHANG W, et al. An App knock-in rat model for Alzheimer's disease exhibiting A β and tau pathologies, neuronal death and cognitive impairments[J]. Cell Res, 2022, 32(2):157-175. DOI:10.1038/s41422-021-00582-x.

- [15] PUPO A, FERNÁNDEZ A, LOW S H, et al. AAV vectors: The Rubik's cube of human gene therapy[J]. *Mol Ther*, 2022, 30(12): 3515-3541. DOI:10.1016/j.jymthe.2022.09.015.
- [16] ASCHAUER D F, KREUZ S, RUMPEL S. Analysis of transduction efficiency, tropism and axonal transport of AAV serotypes 1, 2, 5, 6, 8 and 9 in the mouse brain[J]. *PLoS One*, 2013, 8(9): e76310. DOI:10.1371/journal.pone.0076310.
- [17] ROSTAGNO A A. Pathogenesis of Alzheimer's disease[J]. *Int J Mol Sci*, 2022, 24(1):107. DOI:10.3390/ijms24010107.
- [18] KAYED R, LASAGNA-REEVES C A. Molecular mechanisms of amyloid oligomers toxicity[J]. *J Alzheimers Dis*, 2013, 33(Suppl 1): S67-S78. DOI:10.3233/JAD-2012-129001.
- [19] FOLKESSON R, MALKIEWICZ K, KLOSKOWSKA E, et al. A transgenic rat expressing human APP with the Swedish Alzheimer's disease mutation[J]. *Biochem Biophys Res Commun*, 2007, 358(3):777-782. DOI:10.1016/j.bbrc.2007.04.195.
- [20] KLOSKOWSKA E, PHAM T M, NILSSON T, et al. Cognitive impairment in the Tg6590 transgenic rat model of Alzheimer's disease[J]. *J Cell Mol Med*, 2010, 14(6B):1816-1823. DOI:10.1111/j.1582-4934.2009.00809.x.
- [21] FENG W X, ZHANG Y L, WANG Z, et al. Microglia prevent beta-amyloid plaque formation in the early stage of an Alzheimer's disease mouse model with suppression of glymphatic clearance[J]. *Alzheimers Res Ther*, 2020, 12(1):125. DOI:10.1186/s13195-020-00688-1.
- [22] LI Z Y, ZHANG Y, MENG X B, et al. A novel DPP-4 inhibitor Gramcyclin A attenuates cognitive deficits in APP/PS1/tau triple transgenic mice *via* enhancing brain GLP-1-dependent glucose uptake[J]. *Phytother Res*, 2022, 36(3):1297-1309. DOI: 10.1002/ptr.7387.
- [23] HAMPTON D W, WEBBER D J, BILICAN B, et al. Cell-mediated neuroprotection in a mouse model of human tauopathy[J]. *J Neurosci*, 2010, 30(30): 9973-9983. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0834-10.2010.
- [24] KIM H Y, LEE D K, CHUNG B R, et al. Intracerebroventricular injection of amyloid- β peptides in normal mice to acutely induce Alzheimer-like cognitive deficits[J]. *J Vis Exp*, 2016 (109):53308. DOI:10.3791/53308.
- [25] SU Y C, WALKER J R, PARK Y, et al. Novel NanoLuc substrates enable bright two-population bioluminescence imaging in animals[J]. *Nat Methods*, 2020, 17(8):852-860. DOI: 10.1038/s41592-020-0889-6.
- [26] TIAN X D, ZHANG Y Y, LI X Y, et al. A luciferase prosubstrate and a red bioluminescent calcium indicator for imaging neuronal activity in mice[J]. *Nat Commun*, 2022, 13(1): 3967. DOI:10.1038/s41467-022-31673-x.

(收稿日期:2025-03-01 修回日期:2025-04-14)

(本文责任编辑:张俊彦)

[引用本文]

肖林林, 杨逸萱, 黎珊杉, 等. 利用脑立体定位技术将人源三突变 APP 基因导入海马区构建阿尔茨海默病大鼠模型[J]. *实验动物与比较医学*, 2025, 45(3): 269-278. DOI: 10.12300/j.issn.1674-5817.2025.030.

XIAO L L, YANG Y X, LI S S, et al. Establishment of a rat model of Alzheimer's disease by introducing human triple mutant APP gene into hippocampus via brain stereotactic technology[J]. *Lab Anim Comp Med*, 2025, 45(3): 269-278. DOI: 10.12300/j.issn.1674-5817.2025.030.

《实验动物与比较医学》2025年征订启事

《实验动物与比较医学》(CN 31-1954/Q, ISSN 1674-5817)由上海科学院主管,上海市实验动物学会和上海实验动物研究中心联合主办,是我国实验动物科学及比较医学领域创刊最早的一本专业学术期刊。本刊目前是中国科技论文统计源期刊(即中国科技核心期刊),并被荷兰 Scopus、瑞典 DOAJ、美国 Chemical Abstracts 和 Ulrichsweb、英国 CAB Abstracts 和 Global Health、波兰 ICI World of Journals 和 ICI Master List、WHO 西太平洋地区医学索引(WPRIM)和美国 EBSCO 数据库,以及中国开放获取期刊数据库、中国核心期刊数据库、中国科技期刊数据库、中国生物医学文献数据库、中国期刊全文数据库、中国学术期刊综合评价数据库、中国期刊网和万方医学网等收录,并入选中国医师协会发布的中国医药卫生“核心期刊”目录和中国科协组织的2022—2024年度“科技期刊双语传播工程”,参与中国科技期刊卓越行动计划二期集群化试点项目(B5)。

本刊兼顾理论与实践、普及与提高,刊登实验动物科学和比较医学领域的研究及应用新成果、新进展、新信息。期刊内容主要涉及人类疾病动物模型(荣获2024年华东地区期刊优秀栏目)、实验动物资源开发与利用、实验动物管理、实验动物福利与伦理、动物实验技术与方法、实验动物医学、比较医学方法研究,以及以实验动物为基础的生物医药各领域基础与应用研究。读者对象为生物学、医学、药学、动物学和农学等各领域从事实验动物生产、繁育、检测和管理,以及应用实验动物进行比较医学研究的广大科技工作者、教育工作者和医学工作者。欢迎订阅!

本刊为中文双月刊,大16开,彩色印刷;全年出版6期,每期定价30元/本,全年定价180元/套。读者可在各地邮局订阅,邮发代号为4-789;也可以联系本刊编辑部购买,联系电话:021-50793657。E-mail:bjb50793657@163.com。编辑部地址:上海市浦东新区金科路3577号(邮编201203)。期刊官网地址: <http://www.slarc.org.cn/dwyx>。

《实验动物与比较医学》编辑部