



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14926.18~14926.32—2001  
GB/T 14926.56~14926.64—2001

## 实验动物 微生物学检测方法(4)

Laboratory animal—Microbiological examination methods

2001-08-29发布

2002-05-01实施

中华人民共和国发布  
国家质量监督检验检疫总局

GB/T 14926.18~14926.32—2001

GB/T 14926.56~14926.64—2001

## 目 录

GB/T 14926.18—2001	实验动物 淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒检测方法	1
GB/T 14926.19—2001	实验动物 汉坦病毒检测方法	4
GB/T 14926.20—2001	实验动物 鼠痘病毒检测方法	7
GB/T 14926.21—2001	实验动物 兔出血症病毒检测方法	10
GB/T 14926.22—2001	实验动物 小鼠肝炎病毒检测方法	13
GB/T 14926.23—2001	实验动物 仙台病毒检测方法	16
GB/T 14926.24—2001	实验动物 小鼠肺炎病毒检测方法	19
GB/T 14926.25—2001	实验动物 呼肠孤病毒Ⅲ型检测方法	22
GB/T 14926.26—2001	实验动物 小鼠脑脊髓炎病毒检测方法	25
GB/T 14926.27—2001	实验动物 小鼠腺病毒检测方法	28
GB/T 14926.28—2001	实验动物 小鼠细小病毒检测方法	31
GB/T 14926.29—2001	实验动物 多瘤病毒检测方法	34
GB/T 14926.30—2001	实验动物 兔轮状病毒检测方法	37
GB/T 14926.31—2001	实验动物 大鼠细小病毒(KRV 和 H-1 株)检测方法	40
GB/T 14926.32—2001	实验动物 大鼠冠状病毒/延泪腺炎病毒检测方法	43
GB/T 14926.56—2001	实验动物 狂犬病病毒检测方法	46
GB/T 14926.57—2001	实验动物 犬细小病毒检测方法	49
GB/T 14926.58—2001	实验动物 传染性犬肝炎病毒检测方法	52
GB/T 14926.59—2001	实验动物 犬瘟热病毒检测方法	55
GB/T 14926.60—2001	实验动物 猕猴疱疹病毒Ⅰ型(B 病毒)检测方法	58
GB/T 14926.61—2001	实验动物 猴逆转 D 型病毒检测方法	61
GB/T 14926.62—2001	实验动物 猴免疫缺陷病毒检测方法	64
GB/T 14926.63—2001	实验动物 猴 T 淋巴细胞趋向性病毒Ⅰ型检测方法	67
GB/T 14926.64—2001	实验动物 猴痘病毒检测方法	70

## 前　　言

本标准是对 GB/T 14926.27—1994《实验动物 小鼠腺病毒检验方法》的修订。对检测方法未作改动，仅对原标准的个别文字作了修改。

本标准由中华人民共和国科学技术部提出并归口。

本标准起草单位：中国实验动物学会。

本标准主要起草人：屈霞琴。

本标准于 1994 年 1 月首次发布。

# 中华人民共和国国家标准

## 实验动物

GB/T 14926.27—2001

### 小鼠腺病毒检测方法

代替 GB/T 14926.27—1994

Laboratory animal—Method for examination of  
mouse adenovirus (MAd)

#### 1 范围

本标准规定了小鼠腺病毒(MAd)的检测方法和试剂等。

本标准适用于小鼠 MAd 的检测。

#### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 14926.50—2001 实验动物 酶联免疫吸附试验

GB/T 14926.51—2001 实验动物 免疫酶试验

GB/T 14926.52—2001 实验动物 免疫荧光试验

#### 3 原理

根据免疫学原理,采用 MAd 抗原检测小鼠血清中 MAd 抗体。

#### 4 主要试剂和器材

##### 4.1 试剂

###### 4.1.1 ELISA 抗原

###### 4.1.1.1 特异性抗原

MAd 接种小鼠胚(ME)或小鼠肾(MK)或 3T3 细胞,加维持液培养 4~5 d,当细胞病变达十十~十十十时收获。冻融三次或超声波处理后,低速离心去除细胞碎片,上清液再经超速离心浓缩后制成 ELISA 抗原。

###### 4.1.1.2 正常抗原

ME 或 MK 或 3T3 细胞冻融破碎后,经低速离心去除细胞碎片而获得的上清液。

###### 4.1.2 抗原片

MAd 感染细胞,培养 3~5 d,病变更十~十十时用胰酶消化分散,PBS 洗涤,涂片。室温干燥后,冷丙酮固定 10 min,-20℃保存。

###### 4.1.3 阳性血清

MAd 抗原免疫 SPF 小鼠所获得的抗血清。

###### 4.1.4 阴性血清

SPF 小鼠血清。

#### 4.1.5 酶结合物

辣根过氧化物酶标记羊或兔抗小鼠 IgG 抗体;或辣根过氧化物酶标记葡萄球菌蛋白 A(SPA)。

#### 4.1.6 异硫氰酸荧光素标记羊或兔抗小鼠 IgG 抗体。

#### 4.2 器材

4.2.1 酶标仪。

4.2.2 荧光显微镜。

4.2.3 普通显微镜。

4.2.4 37℃培养箱或水浴箱。

### 5 检测方法

5.1 采用 ELISA 方法(见 GB/T 14926.50—2001)进行血清学检测。

5.2 采用 IFA 方法(见 GB/T 14926.52—2001)进行血清学检测。

5.3 采用 IEA 方法(见 GB/T 14926.51—2001)进行血清学检测。

### 6 结果判定

对阳性检测结果,选用同一种方法或另一种方法重试。如仍为阳性则判为阳性。

### 7 结果报告

根据判定结果,作出报告。

---